

Recomendaciones generales en atención primaria

- No prescriba antibióticos para la bacteriuria asintomática en pacientes no embarazadas. [Ingreso Hospitalario # 2](#)
- No trate la tos de adultos con antibióticos, incluso si dura más de 1 semana, a menos que se sospeche una neumonía bacteriana (la duración media de la tos viral es de 18 días). [Medicina respiratoria # 4](#)
- No use antimicrobianos para tratar la bacteriuria en adultos mayores, a menos que se presenten síntomas específicos del tracto urinario. [Geriatría # 1](#)
- No prescriba rutinariamente formas intravenosas de agentes antimicrobianos altamente biodisponibles para pacientes que pueden tomar y absorber medicamentos orales. [Enfermedad infecciosa # 1](#)
- No prescriba antimicrobianos alternativos de segunda línea a pacientes que informen reacciones no graves a la penicilina, ya que los betalactámicos son la terapia de primera línea recomendada. [Enfermedad infecciosa # 2](#)
- No recomiende antimicrobianos para tratar la bacteriuria en adultos mayores, a menos que se presenten síntomas específicos del tracto urinario. [Enfermería # 1](#)
- No use antimicrobianos para tratar la bacteriuria asintomática en los ancianos. [Urología # 4](#)
- No trate las infecciones del tracto urinario asintomáticas en pacientes con sonda urinaria. [Medicina física y rehabilitación # 1](#)
- No recomiende antibióticos para las infecciones que probablemente sean de origen viral, como una enfermedad similar a la influenza. [Enfermería: Infección y Control de Prevención # 2](#)