

!!! ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE !!!

CAMBIO EN FORMATOS DE ANTIBIÓTICOS

OBJETIVO → Ajustar el tamaño de los envases a la evidencia científica actual y a las recomendaciones de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del SNS.

Se adaptarán los envases a las pautas recomendadas actualmente.

SE QUIERE DISMINUIR

- Resistencia bacteriana.
- Dosis no necesarias.
- Automedicación.

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE PRESCRIPCIÓN SE ACTUALIZARÁN

Para ajustar las unidades pautadas al envase más adecuado.

Cambio respaldado por las sociedades científicas y colegios profesionales.



Los formatos grandes dejarán de estar disponibles para evitar dispensaciones con contenido superior al prescrito.

EL DENTISTA, CLAVE EN EL ÉXITO DEL CAMBIO

Ajustando la prescripción a las pautas recomendadas por la Guía del SNS.



1 ENVASE = Tratamiento completo



EJEMPLO

Amoxicilina

- En muchas de las patologías orales no está indicado tratamiento con antibiótico.
- En los casos en los que sí está indicado, el envase de 20 es suficiente.
- Se elimina el formato de 30 uds. para evitar dosis no necesarias.
- Prescribir únicamente **1 envase de 20 uds.** (NO 2 envases).

INFORMA A TU PACIENTE

- El envase prescrito incluye las unidades necesarias para completar los tratamientos más habituales.
- La eficacia del tratamiento no se ve afectada.
- Reducimos la resistencia bacteriana.

MÁS INFORMACIÓN

Consulta la Web de AEMPS para conocer los antibióticos afectados.

www.formatosantibioticos.aemps.gob.es

PRESCRIBE
SEGÚN LA
GUÍA PRAN



MENSAJES CLAVE PARA ODONTÓLOGOS



- No se recomienda el uso sistemático de antimicrobianos en la profilaxis de endocarditis bacteriana en procedimientos dentales. Valora de forma individualizada a aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa para realizar la profilaxis antibiótica 1/2 – 1 hora antes del procedimiento.
- No se recomienda la prescripción de antimicrobianos como tratamiento para el dolor dental. Además de ineficaz, conlleva un mayor riesgo de aparición de resistencias. En su lugar, recomienda un tratamiento sintomático para el dolor y derivación al dentista para un adecuado diagnóstico y abordaje