



## NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES

### Dabigatran (DA), Rivaroxaban (RI) y Apixaban (AP)

#### ●●●●● Indicaciones

Prevención del ictus y de embolias sistémicas en pacientes con fibrilación auricular no valvular con factores de riesgo.

Prevención primaria de tromboembolismo en cirugía de reemplazo de cadera o rodilla.

#### ●●●●● Administración

La dosis y pauta de tratamiento será según medicamento e indicación.

Ajustar dosis en insuficiencia renal, en ancianos para DA y AP, con verapamilo para DA y peso en AP.

#### ●●●●● Reacciones adversas

Hemorragias, problemas digestivos (RI y DA).

#### ●●●●● Interacciones

Posee menos que los antiguos anticoagulantes orales. Se debe consultar en cada caso si la interacción esta contraindicada o solo se debe tener precaución.

Disminuyen sus efectos: Rifampicina, Carbamacepina, Fenitoina y hierba de San Juan.

Aumentan sus efectos: antiagregantes plaquetarios, AINEs, Ketoconazol, Itraconazol, Posaconazol, Ritonavir. Para RI y AP: Voriconazol. Para DA: ISRSs y los ISRSNs, Verapamilo, Amiodarona, Quinidina, Claritromicina, Tacrolimus, Ciclosporina y la Dronedarona (también con RI).

#### ●●●●● Precauciones

Vigilar síntomas y signos de sangrados. En caso de sobredosis no existe antídoto específico.

DA debe evaluarse la función renal antes y durante el tratamiento. También se recomienda para RI y AP. Para AP realizar pruebas de función hepática antes de inicio.

No usar en embarazo. No utilizar en intolerancia a la lactosa (AP y RI). Vigilar su uso con anticoagulantes orales bajo circunstancias de terapia secuencial (resto casos contraindicado).

#### ●●●●● Valoración de la respuesta

Ausencia de complicaciones trombóticas.

#### ●●●●● Información al paciente

Dada la ausencia de controles es muy importante cumplir el tratamiento haciendo hincapié en el riesgo de sufrir un ictus o embolia si se abandona el tratamiento. Tomar siempre a la misma hora. Informar de este tratamiento ante cualquier intervención (odontólogo,...). No usar en embarazo (categoría C: DA, RI, categoría B: AP) ni lactancia. Precaución al afeitarse o cepillarse los dientes. Verificar que el paciente no toma otros fármacos que puedan aumentar el riesgo de hemorragia. Si aparecen hemorragias acudir al médico.

Pueden tomarse con o sin alimentos, excepto RI 15, 20 mg o si molestias gástricas que se deben tomar con comidas.

Tomar las cápsulas y los comprimidos enteros. RI puede triturarse y mezclarse con agua antes de su uso. El DA no debe ser almacenado fuera de su envase original.